

Мышиная лихорадка



Источники вируса ГЛПС: полевая, домовая мыши, серая и черная крысы, различные виды полевок

Способы заражения:
Воздушно-пылевой вид заражения, при котором вдыхается пыль, содержащая экскременты с вирусом
Алиментарный вид заражения, при котором употребляется пища или вода, загрязненные выделениями

Признаки и симптомы мышиной лихорадки

Первый этап. Происходит инфицирование. Инкубационный период 2-3 недели. Вирус распространяется по всему организму. Болезнь никак не проявляется.

Второй этап. Лихорадка развивается стремительно. Симптомы напоминают простуду или грипп. **Высокая температура до 40 градусов, тошнота, рвота, ломота, слабость, краснота кожи или сыпь.**

Третья стадия. Нарушается работа почек. Уменьшается суточное количество выделяемой мочи. Период продолжается 7-9 дней. Появляются боли в пояснице и внизу живота. Рвота усиливается. В конце третьей стадии температура может спасть, усиливается слабость и ломота мышц.

Четвертая стадия. При игнорировании лечения появляются отеки, состояние человека становится еще хуже, появляется депрессия и апатия. Болезнь очень опасна для здоровья и имеет множество осложнений.

В целях профилактики:

- во время работы при большом количестве пыли (снос старых строений, погрузка сена разборка брёвен, куч хвороста, уборка помещений и т.п.) необходимо использовать рукавицы и респиратор или ватно-марлевую повязку;
- уборка помещений должна проводиться только влажным способом;
- продукты должны быть недоступными для грызунов, храниться в металлической, пластиковой плотно закрывающейся таре;
- не следует употреблять воду из открытых водоемов;
- строго запрещается курить и принимать пищу немытыми руками;
- нельзя прикасаться к живым или мёртвым грызунам без резиновых перчаток.

Горожанам, имеющим дачные и садовые участки, весной и осенью необходимо:

- обеспечить грызунонепроницаемость в загородных домах, сооружениях
- приобретать и раскладывать готовые отравленные приманки или другие средства борьбы с грызунами в жилых помещениях, на прилегающих к домам территориях, садовых участках или заключать договора с организациями дезинфекционного профиля для проведения профилактических дератизационных мероприятий.